



ZAFFRE KİMYA



AROTECH

HAYVANSAL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE



GARANTİ EDİLEN İÇERİK W / W

Toplam Organik Madde % 61

Organik Azot % 8

Organik Karbon % 15

Serbest Aminoasitler % 8

pH aralığı 5,0 - 7,0

ÖZELLİKLERİ VE ETKİ ŞEKLİ :

Arotech, hayvansal orijinli sıvı organik gübre olup serbest amino-asitler ile uzun ve kısa zincirli peptitleri optimal oranda ve çok iyi dengelenmiş bir şekilde içermektedir. Arotech, gerek sulama suyu gerekse yaprakтан uygulama şeklinde kullanılmakta ve sudaki toplam çözünürlüğünün çok yüksek olması nedeniyle bitkiler tarafından hızlı bir şekilde alınmakta ve sistemik olarak tüm bitki kısımlarına taşınmaktadır.

UYGULAMA ŞEKLİ :

Arotech, yaprakтан, topraktan ve sulama suyu ile uygulanabilmektedir. Uygulamanın sayısı, bitkilerin içinde bulunduğu duruma bağlı olmakla birlikte en uygun uygulama zamanları dikim sonrasında, gelişme, çiçeklenme, meyve tutumu ve olgunlaşma gibi vegetatif aktivitenin en yüksek olduğu dönemlerdir.

* Genel bir ifadeyle yaprakтан uygulamalar bitkilerin vegetatif olarak olarak en hassas oldukları dönemlerde 200-300 ml/100 litre su dozlarında gerçekleştirilmeli, don olayı, görüldüğünde 400 ml/100 litre su dozunda uygulama yapılmalıdır. Toprakтан uygulamalarda, damlama sulama sistemi tercih edilmelidir. Bununla beraber, toprak enjeksiyonu veya taşıma sulama şeklinde de uygulanabilmektedir. Bitkilerin tüm vejetasyonu süresince 300-400 ml/da dozda en az 4 uygulama yapılmalıdır.

* Kalıntı sorunu yoktur, kirlilik ve bulaşıklık riski taşımaz.

FİRMA BEYANI :

Ürünün üretici tarafından kullanımı firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamada doğacak sorunlardan firmamız sorumluluk kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisidir.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR : a

Arotech, tüm gübrelere, ilaçlara ve bitki koruma ürünlerinin çoğuna tank karışımı şeklinde uygulanabilir. Tank karışımında ikiden fazla ürün kullanılmamalıdır. Mineral yağlar ve dnoc gibi nitro türevleri ile karışımından kaçınılmalıdır. Zeytin, tahıllar ve soğanda bakır içerikli fungusitler ile risksiz tank karışımı uygulamaları yapılabilir. Kökürüt ve bakırli bileşiklerin her ikisi ile yapılacak tank karışımlarında hedef kültür bitkisi üzerinde ön testler yapılmalı, uygulamayı izleyen günlerde oluşabilecek reaksiyonlar gözlemlenmelidir. Bakırli bileşiklerin uygulanmasının zorunlu olduğu durumlarda, arotech uygulamasından 3-4 gün sonra yapılmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI : ü

Ürün, kendi orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmayan, serin ve kuru bir ortamda, 0°C - 30°C arasında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 5 yıl korur. Bu nedenle ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. Ürünü hiçbir şekilde güneş ışığına maruz bırakmayınız.

20 Lt

AROTECH

HAYVANSAL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ
KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ

UYARILAR :

- Önce etiketi okuyunuz.
- Çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Gübreleme esnasında Maske, Eldiven ve Gözlük kullanınız.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde hemen bol su ile yıkayınız.
- Ürünü yutmayınız, yutulması halinde doktora başvurunuz.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz



DİKKAT !

- HAYVANSAL GIDA AMAÇLI KULLANILMAZ.
- ÇİFTLİK HAYVANLARININ ERİŞEBİLDİĞİ TOPRAĞA UYGUNLAZ.
- UYGULANDIKTAN SONRA EN AZ 21 GÜN BOYUNCA HAYVANLAR OTLATILAMAZ VEYA BURADAN BİÇİLEN OTLAR HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILMAZ.

Lisans No: 3465

Tescil No: 2023T03668

Çalışma İzin No: TR-10-06-015



ZAFFRE KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

Gönen O.S.B. Bostancı Mh. 1. Cd. No: 20

Gönen/Balıkesir/TÜRKİYE

Tel : +90 507 149 66 64 - GSM : +90 542 211 81 41

E-mail : satis@zaffrekimya.com www.zaffrekimya.com

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMLERİ	YAPRAKTAN UYGULAMA DOZU
Antepfıstığı, Badem, Ceviz, Fındık, Kestane	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde	250 ml/100 Lt.su
Armut, Elma, Ayva,	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6-7 cm çaplı olduğunda	200-300 ml/100 Lt.su
Ayçiçeği	3-4 gerçek yapraklı dönemde ve çiçeklenme öncesinde, 2 uygulama şeklinde	300-500 ml/da
Arpa, Buğday, Çavdar, Yulaf	4-5 yapraklı dönemde kardeşlenme sonuna kadar ve kardeşlenmeden sonra 2 uygulama	300-500 ml/da
Bağ	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde ve meyve renk değişim döneminde	250-300 ml/100 Lt.su
Bezelye	Çiçeklenme öncesi, çiçeklenmeden sonra 10-15 gün aralıklarla 3 uygulama	250-300 ml/100 Lt.su
Çeltik	Kardeşlenme ve çiçeklenme dönemlerinde 2 uygulama	1. uyg: 400-500 ml/da 2. uyg: 500-600 ml/da
Domates, Biber, Patlıcan (Tarla)	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumu, meyve olgunluğu dönemlerinde	250-300 ml / da
Domates, Biber, Patlıcan (Sera)	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumu, meyve olgunluğu dönemlerinde	250-300 ml/100 Lt.su
Çilek (Tarla)	Çiçeklenmeden 20-30 gün önce, meyve tutumundan 3-5 gün önce, üretim sezonu sonuna kadar 20 günde bir	200-250 ml / da
Çilek (Sera)	Kış dormansisinden önce, vegetatif gelişme başlangıcında, çiçeklenmeden 20-30 gün önce, meyve tutumundan 3-5 gün önce, üretim sezonu sonuna kadar 20 günde bir	200-250 ml/100 Lt.su
Erik, Kayısı, Şeftali, Nar, Kiraz, Vişne	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde, meyveler 6-7 cm çaplı olduğunda	200-250 ml/100 Lt.su
Enginar	Dikimden 3 gün sonra ve 15 - 20 günde bir 4 uygulama	200-300 ml/100 Lt.su
Fasulye	Çiçeklenme öncesi, çiçeklenmeden sonra 10-15 gün aralıklarla 3 uygulama	300 ml/100 Lt.su
Greyfurt, Limon, Portakal, Mandalin	Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6-7 cm çaplı olduğunda	200-300 ml/100 Lt.su
Havuç	Kökler kurşun kalem büyüklüğünü aldığı 2-3 haftada bir 3-4 uygulama	300-400 ml/da
Hiyar (Tarla)	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumu, meyve olgunluğu dönemlerinde	300 ml/da
Hiyar (Sera)	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumu, meyve olgunluğu dönemlerinde	100-250 ml/100 Lt.su
Karpuz, Kavun, Kabak (Tarla)	4-5 yapraklı, çiçeklenme öncesi, meyve tutumu, meyve olgunluğu dönemlerinde	300 ml/da
Karpuz, Kavun, Kabak (Sera)	4-5 yapraklı, çiçeklenme öncesi, meyve tutumu, meyve olgunluğu dönemlerinde	100-250 ml/100 Lt.su
Kayısı, Şeftali, Nektarin, Vişne, Kiraz	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde, meyveler 6-7 cm çaplı olduğunda	200-250 ml/100 Lt.su
Kereviz, Prasa	Ekimden / Dikimden 10-15 gün sonra başlamak üzere 20 günde bir uygulama	250 ml/da
Kivi	Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi, Taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6-7 cm çaplı olduğunda	150-200 ml/100 Lt.su 250-300 ml/100 Lt.su
Kolza	Yan dalların oluşumu ve gövdenin uzama dönemlerinde 2 uygulama	200 ml/da
Ispanak, Şekerpancarı,	Ekimden / Dikimden 15-20 gün sonra başlamak üzere 20 günde bir uygulama	250 ml/da
Lahanagiller	Dikim sonrası ve 20 gün aralıkla iki uygulama	250-300 ml/da
Marul (Tarla)	Şaşırtmadan 10-15 gün sonra 20 günde bir uygulama	250 ml/da
Marul (Sera)	Şaşırtmadan 10-15 gün sonra 20 günde bir uygulama	250 ml/100 Lt.su
Maydanoz	Kökler kurşun kalem büyüklüğünü aldığı 2-3 haftada bir 3-4 uygulama	250-300 ml/da
Mercimek, Mısır, Nohut, Soya	Ekimden 25 gün sonra, 15 gün aralıkla 3 uygulama	200-250 ml / da
Muz	Çiçeklenme meyve dökümü ve oluşumu, renk değişimi, don gibi kritik dönemlerde 12- 14 gün aralıklarla, 2-4 uygulama (1-2 yaşındaki genç bitkilerdedüşük dozu kullanınız)	250-350 ml/da
Pamuk	3-4 yapraklı, çiçeklenmeden önce ve sonra 3 uygulama	200-300 ml/da
Patates	Bitkiler 15 cm olduğunda,yumrular fındık büyüklüğünü aldığı ve 15 gün sonra	200-300 ml/da
Soğan, Sarımsak	Yumruların oluşmaya başlayınca her 20 günde bir, bakırli bileşiklerle tank karışımı yapılabilir	200-300 ml/da
Tütün	Fide dikiminden 20 gün sonra başlayarak 15 gün aralıklarla 3 uygulama	200-250 ml/da
Yer Fıstığı	Ekimden 25 gün sonra, 15 gün aralıkla 3 uygulama	250-300 ml/da
Zeytin	Tomurcuk oluşum, çiçeklenme öncesi ve meyve renk değişimi sırasında ve gereklyse hasattan sonra	250-300 ml/100 L.su