

ÖZELLİKLERİ VE ETKİ ŞEKLİ :

AROTECH, hayvansal orijinli sıvı organik gübre olup serbest amino-asitler ile uzun ve kısa zincirli peptitleri optimal oranda ve çok iyi dengelenmiş bir şekilde içermektedir. Arotech, gerek sulama suyu gerekse yaprakтан uygulama şeklinde kullanılmakta ve sudaki toplam çözünürlüğünün çok yüksek olması nedeniyle bitkiler tarafından hızlı bir şekilde alınmakta ve sistemik olarak tüm bitki kısımlarına taşınmaktadır.

UYGULAMA ŞEKLİ :

AROTECH, yaprakтан, topraktan ve sulama suyu ile uygulanabilmektedir. Uygulamaların sayısı, bitkilerin içinde bulunduğu duruma bağlı olmakla birlikte en uygun uygulama zamanları dikim sonrasında, gelişme, çiçeklenme, meyve tutumu ve olgunlaşma gibi vegetatif aktivitenin en yüksek olduğu dönemlerdir. * Genel bir ifadeyle yaprakтан uygulamalar bitkilerin vegetatif olarak olarak en hassas oldukları dönemlerde 200-300 ml/100 litre su dozlarında gerçekleştirilmeli, don olayı, görüldüğünde 400 ml/100 litre su dozunda uygulama yapılmalıdır. Toprakтан uygulamalarda, damlama sulama sistemi tercih edilmelidir. Bununla beraber, toprak enjeksiyonu veya taşıma sulama şeklinde de uygulanabilmektedir. Bitkilerin tüm vejetasyonu süresince 300-400 ml/da dozda en az 4 uygulama yapılmalıdır.

* Kalıntı sorunu yoktur, kirlilik ve bulaşıklık riski taşımaz.

FİRMA BEYANI :

Ürünün üretici tarafından kullanımı firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamada doğacak sorunlardan firmamız sorumluluk kabul etmez. Ürünün spesifikasyonuna uygunluğu sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisidir.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR : a

Arotech, tüm gübrelere, ilaçlara ve bitki koruma ürünlerinin çoğuna tank karışımı şeklinde uygulanabilir. Tank karışımında ikiden fazla ürün kullanılmamalıdır. Mineral yağlar ve dnoc gibi nitro türevleri ile karışımından kaçınılmalıdır. Zeytin, tahıllar ve soğanda bakır içerikli fungisitler ile riskli tank karışımı uygulamaları yapılabilir. Kültür ve bakır bileşiklerinin her ikisi ile yapılacak tank karışımlarında hedef kültür bitkisi üzerinde ön testler yapılmalı, uygulamayı izleyen günlerde oluşabilecek reaksiyonlar gözlemlenmelidir. Bakır bileşiklerinin uygulanmasının zorunlu olduğu durumlarda, arotech uygulamasından 3-4 gün sonra yapılmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI : ü

Ürün, kendi orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmayan, serin ve kuru bir ortamda, 0°c - 30°c aralığında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 5 yıl korur. Bu nedenle ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. Ürünü hiçbir şekilde güneş ışığına maruz bırakmayınız.

UYARILAR :

- Önce etiketi okuyunuz.
- Çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Gübrelere esnasında Maske, Eldiven ve Gözlük kullanınız.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde hemen bol su ile yıkayınız.
- Ürünü yutmayınız, yutulması halinde doktora başvurunuz.
- Kullanımından sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz



**AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ
KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ**

DİKKAT !

- HAYVANSAL GIDA AMAÇLI KULLANILMAZ.
- ÇİFTLİK HAYVANLARININ ERİŞİLDİĞİ TOPRAĞA UYGULANMAZ.
- UYGULANDIKTAN SONRA EN AZ 21 GÜN BOYUNCA HAYVANLAR OTLATILMAZ VEYA BURADAN BİÇİLEN OTLAR HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILMAZ.



ZAFFRE KİMYA

AROTECH

HAYVANSAL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

ORGANİK
— ÜRÜNLER —

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W / W

Toplam Organik Madde % 61

Organik Azot % 8

Organik Karbon % 15

Serbest Aminoasitler % 8

pH aralığı 5,0 - 7,0

1 Lt

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMLERİ	YAPRAKTAN UYGULAMA DOZU
Antepfıstığı, Badem, Ceviz, Fındık, Keşane	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökülmesinde ve meyve tutumu dönemlerinde	250 ml/100 Lsu
Armut, Elma, Ayva	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökülmesinde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6-7 cm çaplı olduğunda	200-300 ml/100 Lsu
Ayçiçeği	3-4 gerçek yapraklı dönemde ve çiçeklenme öncesinde, 2 uygulama şeklinde	300-500 ml/da
Arpa, Buğday, Çavdar, Unlu	4-5 yapraklı dönemden kardeşlenme sonuna kadar ve kardeşlenmeden sonra 2 uygulama	300-500 ml/da
Bağ	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökülmesinde ve meyve renk değişim döneminde	250-300 ml/100 Lsu
Bereye	Çiçeklenme öncesi, çiçeklenmeden sonra 10-15 gün aralıklarla 3 uygulama	250-300 ml/100 Lsu
Çalılık	Kardeşlenme ve çiçeklenme dönemlerinde 2 uygulama	1 uyg. 400-500 ml/da 2 uyg. 500-600 ml/da
Domates, Biber, Patlıcan (Tarlada)	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumu, meyve olgunluğu dönemlerinde	250-300 ml / da
Domates, Biber, Patlıcan (Sera)	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumu, meyve olgunluğu dönemlerinde	250-300 ml/100 Lsu
Çilek (Tarlada)	Çiçeklenmeden 20-30 gün önce, meyve tutumundan 3-5 gün önce, üretim sezonu sonuna kadar 20 günde bir	200-250 ml / da
Çilek (Sera)	Kış domansisinden önce, vegetatif gelişme başlangıcında, çiçeklenmeden 20-30 gün önce, meyve tutumundan 3-5 gün önce, üretim sezonu sonuna kadar 20 günde bir	200-250 ml/100 Lsu
Erik, Kayısı, Şeftali, Nar, Kiraz, Vişne	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökülmesinde, meyve tutumu döneminde, meyveler 6-7 cm çaplı olduğunda	200-250 ml/100 Lsu
Enginar	Dikimden 3 gün sonra ve 15 - 20 günde bir 4 uygulama	200-300 ml/100 Lsu
Fasulye	Çiçeklenme öncesi, çiçeklenmeden sonra 10-15 gün aralıklarla 3 uygulama	300 ml/100 Lsu
Greyfurt, Limon, Portakal, Mandalın	Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökülmesinde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6-7 cm çaplı olduğunda	200-300 ml/100 Lsu
Havuç	Kökler kurgun kalem büyüklüğünde olduğunda 2-3 haftada bir 3-4 uygulama	300-400 ml/da
Hiyar (Tarlada)	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumu, meyve olgunluğu dönemlerinde	300 ml/da
Hiyar (Sera)	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumu, meyve olgunluğu dönemlerinde	300-250 ml/100 Lsu
Karpuz, Kavun, Kabak (Tarlada)	4-5 yapraklı, çiçeklenme öncesi, meyve tutumu, meyve olgunluğu dönemlerinde	300 ml/da
Karpuz, Kavun, Kabak (Sera)	4-5 yapraklı, çiçeklenme öncesi, meyve tutumu, meyve olgunluğu dönemlerinde	300-250 ml/100 Lsu
Kayısı, Şeftali, Nektarin, Vişne, Kiraz	Çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökülmesinde, meyve tutumu döneminde, meyveler 6-7 cm çaplı olduğunda	200-250 ml/100 Lsu
Kereviz, Prasana	Ekimden / Dikimden 10-15 gün sonra başlamak üzere 20 günde bir uygulama	250 ml/da
Kivi	Vegetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi, taç yaprakları dökülmesinde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6-7 cm çaplı olduğunda	150-200 ml/100 Lsu 250-300 ml/100 Lsu
Kolza	Kan dökümü oluşumu ve çiçeklenme zamanı dönemlerinde 2 uygulama	200 ml/da
Iskender, Şekerpancarı	Ekimden / Dikimden 15-20 gün sonra başlamak üzere 20 günde bir uygulama	250 ml/da
Lahanağarlar	Dikim sonras ve 20 gün aralıklarla 3 uygulama	250-300 ml/da
Marul (Tarlada)	Sağırtmadan 10-15 gün sonra 20 günde bir uygulama	250 ml/da
Marul (Sera)	Sağırtmadan 10-15 gün sonra 20 günde bir uygulama	250 ml/100 Lsu
Maydanoz	Kökler kurgun kalem büyüklüğünde olduğunda 2-3 haftada bir 3-4 uygulama	250-300 ml/da
Mercimek, Merc, Nohut, Soya	Ekimden 25 gün sonra, 15 gün aralıkla 3 uygulama	200-250 ml / da
Muz	Çiçeklenme meyve dökümü ve olgunluk, renk değişimi, don gibi kritik dönemlerde 12-14 gün aralıklarla, 2-4 uygulama (1-2 yaşındaki genç bitkilerdedüşük doz kullanınız)	250-350 ml/da
Pamuk	3-4 yapraklı, çiçeklenmeden önce ve sonra 3 uygulama	200-300 ml/da
Potates	Bitkiler 15 cm olduğunda, yamurlar fındık büyüklüğünde olduğunda ve 15 gün sonra	200-300 ml/da
Soğan, Sarımsak	Yumurtadan olgunlaşmaya başlanınca her 20 günde bir, bakır bileşikleri tank karışımı yapılabilir	200-300 ml/da
Tütün	Fide dikiminden 20 gün sonra başlayarak 15 gün aralıklarla 3 uygulama	200-250 ml/da
Yer Elması	Ekimden 25 gün sonra, 15 gün aralıkla 3 uygulama	250-300 ml/da
Zeytin	Tomurcuk oluşum, çiçeklenme öncesi ve meyve renk değişimi sırasında ve gerekirse hasattan sonra	250-300 ml/100 Lsu

Lisans No: 3465

Tescil No: 2023T03668

Çalışma İzin No: TR-10-06-015



ZAFFRE KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

Gönen O.S.B. Bostancı Mh. 1. Cd. No: 20 Gönen / Balıkesir / TÜRKİYE

Tel : +90 507 149 66 64 - GSM : +90 542 211 81 41

E-mail : satis@zaffrekimya.com

www.zaffrekimya.com